

Необходимо следить за проведением профилактики у собак против паразитов. Заражение собакой глистами может опасно и для ее владельцев.

Иногда в тяжелых случаях заражения круглыми глистами живые глисты могут быть обнаружены в рвоте. Лентовидные глисты могут встречаться в районе ануса. Однако поставить диагноз представляется трудным, так как обычно глисты не вызывают определенных симптомов. Ленточные глисты провоцируют анальное воспаление и расстройство пищеварения, а наличие в организме круглых глистов может выражаться в плохом росте собаки, поносе, запорах, болях в животе, возможном раздутии живота, увеличении или снижении аппетита. Но все эти признаки нередко свидетельствуют о какой-то другой болезни.

Глистогонные средства можно приобрести как в аптеке, так и в ветеринарном магазине, но для этого желательно знать, какой именно вид глистов у вашей собаки (чтобы купить верное лекарство).

Врач может попросить сделать анализ кала собаки, чтобы установить вид глистов и назначить правильное лечение. В случае, если обнаружены *Dipylidium caninum*, врач также порекомендует вам средство от блох. Имеет смысл поговорить с ветеринаром и о профилактике, касающейся вашей семьи.

Троксокары – этот вид глистов опасен для человека.

Щенки

Регулярный прием глистогонных препаратов (с возраста 2-5 недель в соответствии с предписанием ветеринара).

Приучите щенков ходить в туалет в специально отведенном месте (до того как вы их будите брать с собой на прогулку).

Кал от щенков нужно убирать сразу же.

Щенков младше шести месяцев не следует выгуливать в местах, где играют дети или отдыхают семьи.

Взрослые собаки

Все без исключения беременные суки должны принимать соответствующие препараты, которые направлены против перемещения личинок глистов внутри организма.

Круглые глисты

- *Toxocara canis* — это белый червяк длиной 7,5—15 см.
- В настоящее время считается, что все щенки, рожденные сукой, у которой во время беременности не прогнали глистов, рождаются уже с глистами в кишечнике. Эти глисты смогут откладывать яйца к тому времени, как щенок достигнет возраста 21—30 дней.
- Щенки младше трех месяцев могут заразиться, проглотив яйца глистов с травы, растений в саду или с шерсти своей мамы. Глисты размножаются в желудке щенка, перемещаются внутри организма, возвращаются обратно в кишечник, где и растут. Совсем маленькие щенки могут заразиться через молоко матери.
- У щенков старше 3 месяцев личинки слабо передвигаются по организму: скорее, находятся в состоянии покоя в тканях организма, в частности, в мышцах, диафрагме и почках.
- Когда собака беременеет, спящие личинки активизируются и снова начинают двигаться. Они достигают матки и молочных желез, заражают щенков, таким образом завершая цикл.

Около 30—40% щенков младше трех месяцев имеют в кишечнике взрослых глистов,

Паразиты у собак (глисты)

Автор: Editor

01.08.2011 11:21 -

которые способны откладывать яйца в окружающую среду. Яйцам глистов в кале требуется 2—3 недели, чтобы быть способными заразить собак или людей.

Лентовидные глисты

- Этот вид глистов, живущий в тонком кишечнике собак, представляет собой плоского, разделенного на сегменты червя, достигающего до 50 см в длину.
- Блохи являются переносчиками *Dipylidium caninum*.
- Профилактика заражения включает регулярную борьбу против блох у собаки и в доме.